

馬鈴薯(生食・加工)栽培暦

月		生育経過	施肥・土づくり		病害虫・雑草防除				
月		生育経過	目的	資材名 10a使用量	対象病害虫	薬剤名	倍率 10a薬量 (水100L)	薬量 (水100L)	使用時期 (収穫前)
4	上 中 下	種いも マークイン シンシア その他	種いも マークイン シンシア その他	馬鈴薯2号 100kg	黒あざ病 そうか病 黒あし病	モンカットフロアブル40 アグレプト液剤	200倍 100倍	500ml 1,000ml	植付前
5	上 中 下	萌芽			雑草防除	サクサ液剤 (バスタ液剤)	200ml (200ml)		萌芽前まで (萌芽直前まで)
6	上 中 下	開花始			ナスビ・ハムシ アブラムシ類	モスピランSL液剤	4,000倍	25ml	17日前
					疫病	グリーンクイゼンM水和剤 (グリーンペンコセブ水和剤)	500倍 (500倍)	200g (300g)	7日前 (7日前)
					疫病	ゾーベックエニケート	5,000倍	20ml	7日前
7	上 中 下	①開花盛期 ②結花期 ③ ④塊茎肥大			疫病 (病害多発時)	リラ(アブルフロアブル) (ホライズンドライフロアブル)	1,000倍 (1,500倍)	100ml (66g)	7日前 (14日前)
					軟腐病	バイオキナー水和剤	1,000倍	100g	—
					アブラムシ類	ゲットアクトWDC (モベントフロアブル)	3,000倍 (4,000倍)	33g (25ml)	7日前 (7日前)
					直根病	フロンサイトSC	1,500倍	66ml	7日前
					軟腐病	マテラーナ水和剤	1,000倍	100g	7日前
					疫病	プロボース顆粒水和剤	1,000倍	100g	7日前
					軟腐病	バイオキナー水和剤	1,000倍	100g	—
					疫病	ホライズンドライフロアブル	1,500倍	66g	14日前
					軟腐病	アグレプト液剤	1,000倍	100ml	7日前
					アブラムシ類	ウララDF (アトマイヤー顆粒水和剤)	4,000倍 (15,000倍)	25g (6.6g)	7日前 (14日前)
8	上 中 下	茎葉トップ 処理直後			疫病 塊茎腐敗	レーバスフロアブル	1,500倍	66ml	7日前
					疫病 塊茎腐敗	ランマンフロアブル (ライメフロアブル)	1,500倍 (2,000倍)	66ml (50ml)	7日前 (7日前)
					疫病 軟腐病	フンドーLフロアブル (コサイト3000)	500倍 (1,000倍)	200ml (100g)	— (—)
9	上 中 下	収穫期							
品種:マークイン、シンシア、その他					基幹防除回数:12回(種いもの消毒を含む)				
基肥:N=6.0kg P=21.0kg K=11.0kg					農薬成分カウント:8				

馬鈴薯(特別)栽培暦

月		生育経過	施肥・土づくり		病害虫・雑草防除					
月		生育経過	目的	資材名 10a使用量	対象病害虫	薬剤名	倍率 10a薬量	薬量 (水100L)	使用時期 (収穫前)	成分 カウント
4	上	中	種いも マークイン	馬鈴薯2号 90kg	黒あざ病	モンカットフロアブル40	200倍	500ml	植付前	1
	そうか病				アグレプト液剤	100倍	1,000ml	0		
	黒あし病									
		下 植付	基肥							
5	上	中								
	下									
6	上	中	萌芽		ナスビ・ハムシ アブラムシ類	モスピランSL液剤	4,000倍	25ml	7日前	1
	下									
	上 開花始				疫病	リライアフルフロアブル	800倍	125ml	7日前	2
	中 開花盛期				軟腐病	バイオキナー水和剤	1,000倍	100g	—	0
7	上	中	開花盛期		アブラムシ類	ゲットアウトWDG (モベントフロアブル)	3,000倍 (4,000倍)	33g (25ml)	7日前 (7日前)	1
	中 結花期				直根病	フロンサイトSC	1,500倍	66ml	7日前	1
	下 塊茎肥大				軟腐病	アグレプト液剤	1,000倍	100ml	7日前	0
					疫病	ランマンフロアブル (ライメイフロアブル)	1,500倍 (2,000倍)	66ml (50ml)	7日前 (7日前)	1
					軟腐病	バイオキナー水和剤	1,000倍	100g	—	0
					アブラムシ類	ウララDF (アトマイヤー顆粒水和剤)	4,000倍 (15,000倍)	25g (6.6g)	7日前 (14日前)	1
8	上	中	茎葉トップ 処理直後		疫病	フジドーLフロアブル (コサイト3000)	500倍 (1,000倍)	200ml (100g)	— (—)	0
	軟腐病									
		下								
		上								
		中								
		下								
品種:マークイン										
基肥:N=5.4kg P=18.9kg K=9.9kg										
					基幹防除回数:6回(種いもの消毒を含む)					
					農薬成分カウント:8					