

平成29年度 福岡の八女茶栽培暦 (山間地用) 凡例

基本防除 補助防除

J A ふくおか 八女
八女地域農業振興推進協議会八女茶部会
福岡県茶生産組合連合会

月		2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	
項目		春肥の施用			茶苗の定植 防霜対策開始			芽出し肥 色肥(玉露)			中切・深刈更新 夏肥Ⅰ(煎茶) チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 防除			茶苗挿木			株ならし 夏肥Ⅱ(煎茶) チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 土壌改良資材施用 防除			秋期防除の徹底 深耕			秋肥の施用			秋整枝 チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 防除			自然仕立て園の摘心		
生育と主な管理作業		春肥の施用			茶苗の定植 防霜対策開始			芽出し肥 色肥(玉露)			中切・深刈更新 夏肥Ⅰ(煎茶) チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 防除			茶苗挿木			株ならし 夏肥Ⅱ(煎茶) チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 土壌改良資材施用 防除			秋期防除の徹底 深耕			秋肥の施用			秋整枝 チャトゲコナジラミ クワシロカイガラムシ 防除			自然仕立て園の摘心		
煎茶園の防除		(一)二月			(二)月下旬			(四)月上旬			(五)月下旬			(六)月上旬			(七)月上旬			(七)月下旬			(八)月中旬			(九)月上旬			(十)月中旬		
煎茶園の防除		防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数		
伝統本玉露園の防除		防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数			防除時期 病害虫名 農薬名 希釈倍数 摘採前日数		

農藥使用基準

農薬使用基準

	対象病害虫	農薬番号	農 業 名	系統	換算前日数	希釈倍数	毒性	その他の対象病害虫	備 考
カンザワハダニ		21913	アクテリック乳	乳 普 I-1	7日	1,000倍	B	アブラムシ、カスミカメ	
		11851	アタックオイル乳	乳 普 —	※換算前日数は記載なし	100倍	A	チャタゲ(10-30倍濃度=100倍)、クワジロ	※換算前日には散布しない
		22305	スターマイトフ	フ 普 I-25	7日	2,000倍	C	ホコリダニ	魚毒性強注意
		23505	スターマイトプラスフ	フ 劇 I-25	14日	1,000倍	C	サビダニ類、ホコリダニ	魚毒性強注意
		22094	ダニゲッターフ	フ 普 I-23	7日	2,000倍	B	サビダニ、ホコリダニ、チャタゲ	
		23628	ダ ニ コ ン グ フ	フ 普 I-25	7日	2,000倍	B		
		22034	ダ ニ サ ラ バ フ	フ 普 I-25	7日	1,000倍	A		
		20448	マイトコーネフ	フ 普 I-20	14日+換算前日数	1,000倍	B	サビダニ	被覆面散布日数注意
		17722	ミルベノック乳	乳 普 I-6	7日	1,000倍	C	サビダニ、ホコリダニ、ホンガ	魚毒性強注意
		20106	アブロードエースフ	フ 普 I-16 I-21	14日	1,000倍	C	チャタゲ、サビダニ、ホコリダニ、 クワジロ、コナジラギ	魚毒性強注意
クワシロカイガラムシ		12022	スプラサイド40乳	乳 劇 I-1	14日	1,000倍	B	ホソガ、コカクモン、アブラムシ、 ツバクロムシ、ウツカ、スリップス	魚毒性強注意
		22092	ブルートMC	MC 普 I-7	I-7 →換算前日数に注意	1,000倍	B	チャタゲ	※換算前日に散布 せずの薬剤使用
		19842	アフファーム乳	乳 普 I-6	7日	2,000倍	C	ホソガ、スリップス、 ホコリダニ、ハスモンヨトウ	魚毒性強注意
		23560	エクシレルSEフ	フ 普 I-28	7日	2,000倍	B	ホソガ、ウンカ、スリップス、 ハムシ、ハスモンヨトウ	
チャノコカクモンハマキ チャハマキ エダシャク		18500	カスケード乳	乳 普 I-15	7日	4,000倍	B	ホソガ、コナジラギ、ウツカ、スリップス、 ホコリダニ、ハスモンヨトウ	
		22469	サムコロ10フ	フ 普 I-28	3日	2,000倍	B	ホソガ、ハスモンヨトウ	感受性低下注意
		22910	ディアナSCフ	フ 普 I-5	前日	2,500倍	B	ホソガ、チャタゲ、スリップス	
		20676	ファルコンフ	フ 普 I-18	7日	4,000倍	B	ホソガ、ハスモンヨトウ	感受性低下注意
		22853	フェニックスフ	フ 普 I-28	7日	2,000倍	B	ホソガ、ハスモンヨトウ、チャタゲ	感受性低下注意
		20016	マ ッ チ 乳	乳 普 I-15	7日	2,000倍	A	ホソガ、スリップス	
チャノホソガ (サンカクハマキ)		23235	アグリメック乳	乳 劇 I-6	7日	1,000倍	B	クワジロ、ウツカ、スリップス、ハダニ、 コナジラギ、コナジラギ、オオトリ	
		20811	スタークル顆粒	溶 普 I-4	7日	2,000倍	A	ウンカ、ダチノウス、カスミカメ、 (スリップス)	
		18950	パダンSG	溶 劇 I-14	10日	1,500倍	Bs	ウンカ、スリップス	魚毒性強注意
		20618	バリアード顆粒水	水 普 I-4	7日	2,000倍	A	アブラムシ、ウンカ、スリップス、 (ハムシ)	
チャノミドリヒメコボイ (ウツカ)		21812	ウララDF	水 普 I-29	7日	1,000倍	A	カスミカメ、アブラムシ	混用の場合要検討
		19641	ガンバ水	水 劇 I-12	14日	1,000倍	C	サビダニ、ホコリダニ、カスミカメ、 チャタゲ	魚毒性強注意
		19184	コ テ ツ フ	フ 劇 I-13	7日	2,000倍	C	コナジラギ、エダシャク、サビダニ、 クワジロ、コナジラギ、ウツカ、 (ハダニ)	魚毒性強注意
		22797	コルト顆粒水	水 普 I-9	7日	2,000倍	B	チャタゲ、クワジロ、カスミカメ、 アブラムシ	
チャノキイロザミウマ (スリップス)		21056	ハチハチフ	フ 劇 I-21	14日	1,000倍	C	チャタゲ、サビダニ、ホコリダニ、 カスミカメ、ホソガ	魚毒性強注意
		21471	キラップフ	フ 普 I-2	7日	2,000倍	A		
炭 そ 病		20616	インダーフ	フ 普 F-3	7日	5,000倍	B	もち病、ぬもち病、褐色点門葉病	
		20873	オンリーワンフ	フ 普 F-3	7日	2,000倍	B	もち病、ぬもち病、褐色点門葉病	
		21284	スコア顆粒水	水 普 F-3	7日	2,000倍	B	もち病、ぬもち病、褐色点門葉病	
		20574	アミスター20フ	フ 普 F-11	14日	2,000倍	B	炭そ病、もち病	感受性低下注意
輪 斑 病 新梢枯死症		16823	ダコニール1000フ	フ 普 F-M5	10日	700倍	C	ほろ病、もち病、ぬもち病、褐色点門葉病、 炭そ病、褐色点門葉病	魚毒性強注意
		21795	ナリアWDG	水 普 F-11 F-7	14日	2,000倍	C	もち病、もち病、ぬもち病、 褐色点門葉病、炭そ病	感受性低下注意 魚毒性強注意
		23102	ファンタジスタ顆粒	水 普 F-11	7日	3,000倍	B	炭そ病	感受性低下注意
		18750	フロントイドSCフ	フ 普 F-29	14日	2,000倍	C	もち病、もち病、ぬもち病、褐色かび病、 褐色点門葉病、ホコリダニ	魚毒性強注意
		18821	ベルコート水	水 普 F-M7	14日	1,000倍	A	炭そ病	
赤 焼 病		14625	カスミンボルドー水	水 普 F-M4 F-M1	30日	1,000倍	B	ほろ病、輪斑病、新梢枯死症、 褐色点門葉病	
		22533	コサイド3000水	水 普 F-M1	14日	1,000倍	B	ほろ病、もち病、ぬもち病、 新梢枯死症、褐色点門葉病	
		16104	ベフドー水	水 普 F-M7 F-M1	14日	500倍	B	ほろ病、もち病、ぬもち病、 新梢枯死症、褐色点門葉病、 炭そ病、褐色点門葉病、 褐色点門葉病、褐色点門葉病、 褐色点門葉病、褐色点門葉病	混用の場合要検討

(kg)	肥料名	保証成分率(%)				春 肥			夏 肥			秋 肥			年間 施肥量 (kg)	年間肥料成分量(kg)																
		N	P	K	Mg	2月			3月			4月				5月			6月			7月			8月			9月				
						上	中	下	上	中	下	上	中	下		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
魚菜園	八次原30%濃土	6	2	3	3	120				120																		240	19.2	4.8	7.2	7.2
園	底 肥	21	0	0	0					60																		60	12.6	0.0	0.0	0.0
施	下1/3撒き(10%)	12	2	2	3							60								40							100	12.0	2.0	2.0	3.0	
肥	肥料直土70%	0	0	0	10																100						100	0.0	0.0	0.0	10.0	
基	八次原2%濃土	6	4	4	3																	100		100		100	200	10.0	8.0	8.0	6.0	
準		上記の通り施肥すると右表42kg・青土26.2kgとなります。														合計	53.8	14.8	17.2	26.2												

農藥混用事例表

◎使用直前の混用可
◎混用してよい

△物理性・効果低下などの点で問題がある
▲混用で凝集するが攪拌すれば可

殺虫剤 殺菌剤 および殺虫剤		カンザワハダニほか										クワシロカイガラムシ・ハマキムシ・ウンカ・スリップスほか																	
		アクテリック(乳)	アタックオイル(乳)	スターマイト(フ)	スターマイトプラス(フ)	ダニゲッター(フ)	ダニコング(フ)	バロツク(フ)	ミルベノック(乳)	アグリメック(乳)	アフアー(乳)	アブロードエース(フ)	ウララDF(水)	エクシレルSE(水)	カスケード(乳)	ガンバ(乳)	クラッパ(フ)	コレット(フ)	サムコル(水)	スタークル顆粒(濁)	スプラサイド40(乳)	ティアナSC(水)	バダンSG(濁)	ハチハチ(フ)	バリアード顆粒(水)	ファールコン(フ)	フェニックス(フ)	マツチ(乳)	
炭そ病 輪斑病ほか	アミスター20(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	インダー(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	オンリーワン(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	カスミンボルドー(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コサイド3000(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スコア顆粒(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ダコニール1000(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ナリアWDG(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
クワシロカイガラムシ・ハマキムシ・ウンカ・スリップスほか	ファンタジスタ顆粒(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フロンスайдSC(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ペフトー(水)	▲	×															▲											
	ベルコート(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アグリメック(乳)	○		○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アフアー(乳)	○		○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	アブロードエース(フ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ウララDF(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	▲	○	○	○	○	○	
	エクシレルSE(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	カスケード(乳)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ガンバ(乳)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クラッパ(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コレット(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	コムト顆粒(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	サムコル(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スタークル顆粒(濁)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スプラサイド40(乳)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ティアナSC(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
バダンSG(濁)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○		
ハチハチ(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○		
バリアード顆粒(水)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○		
ファールコン(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○		
フェニックス(フ)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○		
マツチ(乳)	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○		

※ハチハチフロアブルとコテツフロアブル混用はもとより、14日以内の近接散布では薬害を生じる可能性が高い。 平成28年11月1日現在

- 未熟堆肥は、堆肥を腐敗しない完熟堆肥を0.5~2倍しろ。
- 土壌の酸性化、有害土壌微生物のために、8月中旬に深耕しよう。
- 堆肥を健全に生育させるため、**土壌pHが4~5になるように**石灰質資材を撒きよう。
- 施肥の効果を上げるために、中耕しよう。

(有機物施用の効果)

1. 植物の生育に必要な要素を食む。
2. 炭分の保持力が大となる。
3. 土壌の物理性を改善する。
4. 土壌微生物が増加する。

☆冠茶被覆基準☆

被覆資材	透光率	被覆期間	被覆開始時期
化学繊維 すまき 福わら	65%以上	7日以上	2.5～3葉期

(注意事項) ①適期飼育を心掛けること)

病害虫に関する情報は、病害虫防除所・JAふくおか八女のホームページで提供中です。

「用」に就いていない事業等を使用する場合は、普及指導センター、JA、関係機関へお尋ね下さい。

ディアナ SC

■ 9月上旬頃のハマキ類・エダシヤク・スリップスの防除に！



通常園・更新園

の病害防除に

摘採10日前
まで使えます！

ダニール 1000

- 病害の**同時防除**が可能。
- **残効性**に優れ、芽の**バラつき**にも強い。

